

VULCAN

Super 10 EC

POPIS PŘÍPRAVKU

Rychle působící širokospektrý insekticid ve formě emulzního koncentrátu na bázi cypermethrinu a synergující složky piperonylbutoxid.

JAK PŘÍPRAVEK PŮSOBÍ

Přípravek usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed a má také výrazné fumigační vlastnosti. Dráždivé účinky vyvolávají neklid a kontakt hmyzu (ukrytého v puklinách a škvírách) s přípravkem. Velmi spolehlivě hubí všechna vývojová stadia hmyzu.

PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

- Létající hmyz:** moucha domácí, vosy, dospělci komárů, moli.
Lezoucí hmyz: švábovití, blechy, štěnice, cvrček domácí, pavouci, kobercoví brouci, rybenky aj.
Skladištní škůdci: potemník, pilous, korovník, lesák a další.

KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

V domácnostech, k dezinfekci potravinářských provozů (pekárny, mlýny, mlékárny, pivovary, jatka), restaurací, nemocnic, prázdných skladů a technických prostor, na skládkách, v okolí popelnic, na likvidaci mravenčích nebo vosích hnízd apod.

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

Proti švábovitým, mouše domácí, blechám štěnicím, cvrčkům domácím: postřikují se všechna místa a do úkrytů, kde se vyskytují dospělci nebo larvy a nymfy.

Proti mravencům a dřevokazům používá se vyšší dávka ve formě bariér, které zabraňují pronikání mravenců z venku do budov, mezi budovami. Dřevěné stavby se ošetřují proti napadení dřevokazy.

Proti dospělcům komárů postřik se aplikuje na místa (stěny, stropy atd.), kam komáři usedají, u vsáklivých povrchů se doporučuje použít vyšší dávku.

Proti larvám komárů rodu Culex postřikují se líníště jako jsou zatopená technická podlaží, odkalovací nádrže, septiky apod., v žádném případě nepoužívat v čistých vodách!

Proti skladištním škůdcům

Je nutné dokonale mechanicky vyčistit a připravit asanovaný objekt, což zvyšuje perzistentní účinky na škůdce. Nástup účinnosti po zasažení hmyzu je rychlá, k tremoru dochází již během hodiny, u méně citlivých brouků do 3 hodin. K úplnému vyhynutí dojde v průběhu 7 dní. Perzistentní účinnost po postřiku je asi 1 měsíc, u citlivějších druhů se prodlužuje na 2 měsíce.

DÁVKOVÁNÍ

- Slabé zamoření:** 40 ml přípravku v 5 litrech vody na 100 m²
Silné zamoření: 100 ml přípravku v 5 litrech vody na 100 m²

Vulcan Super 10 EC lze použít v potravinářských provozech dle stanoviska Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv Brno pod číslem 3/2012 z 20.1. 2012.

BALENÍ:

Vulcan C se dodává v 1 litrových PET lahvích (10 x 1 litr v přepravním kartonu)



INFORMACE

Na zadní straně lahve je nalepena skládanka s celým zněním etikety.

