

VOSKOVANÉ GRANULE PRO HUBENÍ ŠKODLIVÝCH HLODAVCŮ JEDNORÁZOVÝM PRŮJEM VVNITŘ A VNĚ OBJEKTŮ ZA ÚČELEM OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A USKLADNĚNÝCH PRODUKTŮ A MATERIÁLŮ. ATRAKTIVNÍ SLOŽENÍ ZEJMÉNA PRO MYŠI V MÍSTECH SKLADOVÁNÍ ZELENINY, OVOCE APOD.

Účinná látka: 0,0025% brodifacoum (25 miligramů v 1 kg přípravku)

Složení: 0,001% denatonium benzoát (hořké činidlo)
30,00% parafin (vosk)
69,9965% atraktivní nástrahový materiál (obilí, sušená mrkev, cukr a další potravina a atraktanty).

Přípravek obsahuje hořké činidlo zmírňující riziko nežádoucího požití člověkem. Parafinový obal zaručuje delší trvanlivost nástrahy ve vlhkých podmínkách.

Varování:

Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladuje v uzavřeném obalu. Skladujte uzamčené.
- Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
- Používejte ochranné rukavice.
- Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
- Při používání nejzte, nepijte a nekuřte.
- Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Odstraňte obsah/obal oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum! Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, ale i ptáky a divoce žijící zvířata! Nutná ochrana vodních zdrojů! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Zákaz používání přípravku ve volné přírodě!

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu na použití!
Před použitím vždy důkladně pročtete návod na použití!

Mechanismus účinku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky.

Návod na použití a další informace jsou uvedeny v příbalovém letáčku uvnitř soudku!

Dávkování:

Potkan obecný (dospělec): 10 - 60 g
Myš domácí (dospělec): 5 - 20 g

Biocidní přípravek podle § 5 zákona č. 324/2016 Sb. pro profesionály a odborně způsobilé osoby



Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodenticidem NORAT ATG není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Příznaky otravy a první pomoc:

Krátke po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody po dobu 5-10 minut a vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasažené místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. **antidotem** proti působení brodifacoumu je vitamin K1. Jeho dávku určí lékař nebo veterinář. Léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika pracovního lékařství
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 nepřetržitě
E-mail: tis@vfn.cz

Skladování přípravku:

NORAT ATG se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejaty západ by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem a vlhkem. Skladujte v suchu a dobře větratelném místě a při teplotě +5°C až +35°C.

Doba použitelnosti:

minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel:

PelGar s.r.o.
Na Vysluňi 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959
274 770 944

E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

Výrobce:

Pro PelGar s.r.o. vyrábá a přebaluje
AGROCHEMA, družstvo
675 02 Studenec



S.T.O.



Hmotnost: 3 kg

Číslo výrobní sarže / Datum výroby:
uvedeno na obalu

Bezpečnostní list je k dispozici u dodavatele, výrobce nebo www.pelgar.cz

**NORAT ATG je povolen MZDR čj. CZ - 2017 - 0009.
Spisová značka 37346/2007/SOZ**

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd. Velká Británie.