

NORAT

25 zrní

profi

20 kg



**Biocidní přípravek podle §5 zákona č. 324/2016 Sb.
pro profesionály a osoby odborně způsobilé**

NORAT zrní je rodenticidní požerová nástraha vyrobená z vysoce kvalitní potravinářské pšenice. Je vhodná pro hubení škodlivých hlodavců, zejména myši, které mají tendenci vyhlodávat pouze vnitřní část zrn pšenice. Dochucovadla zvyšují konzumaci nástrahy (její chuťovou atraktivitu) a konzervanty zamezují plesnivění a množení bakterií v případě, že nástraha je aplikována ve vlhkém prostředí. Používá se pro hubení myši a potkanů ve vnitřních a venkovních prostorách kolem budov.

Složení:

0,0025% brodifacoum (25 mg v 1 kg přípravku) – účinná látka
0,0010% denatonium benzoát – hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití
99,9965% atraktivní návnadový materiál a barvivo

Varování:

Může způsobit poškození srážlivosti krve při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- Nevdechujte prach.
- Necitíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.
- Při práci s přípravkem není dovoleno jíst, pít, kouřit.
- Během práce je nutné používat ochranné pracovní prostředky (ochranný oděv, gumové rukavice, gumové boty).
- Rukavice jsou nutné i z hlediska pachových stop, které by mohly hlodavce odrazovat od konzumace.
- Po práci a při každém přerušení práce je nutné si omýt ruce vodou a mýdlem.
- Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata (zejména psy, kočky, prasata a drůbež), ale i ptáky a volně žijící zvířata.



Mechanismus účinku:

Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje propustnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení. Vzhledem k opožděnému působení jsou nástrahy účinné až po 4-10 dnech po požití.

Dávkování: (na jednu deratizační stanicí)

Myš domácí (dospělá) až 20 g zrní
nízká míra zamoření – každých 5 metrů / vysoká míra zamoření – každé 2 metry

Potkan obecný (dospělý) 10 – 60 g zrní
nízká míra zamoření – každých 10 metrů / vysoká míra zamoření – každých 5 metrů

Návod na použití:

Aplikace se provádí do jedových stanic, které musí být označeny nápisem, že obsahují látku k hubení hlodavců a být odolné vůči neoprávněnému otevření. Je nutné zabránit přístupu zvířat k nástraze, která musí být zajištěna proti jejímu odtahování mimo místa aplikace. Přípravek vkládejte do stanic pomocí dávkovacího zařízení. Při použití na myš domácí je nutné stanici kontrolovat nejméně každé 2-3 dny v počáteční fázi deratizace. U potkana obecného nejdříve za 5-7 dnů. Délka ošetření nesmí přesáhnout 35 dní. Nepoužívejte přípravek v místech, kde se manipuluje s potravinami či krmivy a kuchyňským náčiním. Pro venkovní použití musí být nástraha umístěna tak, aby byl minimalizován kontakt nečlověkových organismů a nebezpečí požití (dětí, ptáků, zvířat). V případě použití pulzační metody (rozptýlení nástrah v malém množství na více míst tam, kde je předpokládán největší výskyt hlodavců tj. do děr, nor, skrýší atd.), nahrazujte zkonsumovanou nástrahu po 3 dnech a pak maximálně v sedmidenních intervalech. Neaplikujte přípravek v místech, kde hrozí záplavy. Pro zabránění rezistence nepoužívejte střídavě různé antikoagulanty se srovnatelnou či slabší účinností. Vždy postupujte podle pokynů uvedených v příslušném kodexu osvědčených postupů deratizace.

Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v tomto návodu a kodexu.

Příznaky otravy a první pomoc:

Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení očí: Udržte víčka roztážená a vymývejte proudem čisté vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasažené místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu: Přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. Antidotem proti působení brodifacoumu je vitamin K1. Jeho dávku určí lékař nebo veterinář.

Telefonní čísla pro naléhavé případy:

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02 nepřetržitě
tis@vfn.cz www.tis-cz.cz

Skladování přípravku:

NORAT 25 zrní se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladních oddělených od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejatý zápach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem a vlhkem. Skladujte v suchu a dobře větratelném místě a při teplotě +5° až +35°C.

Likvidace obalů:

Prázdňé papírové pytle (po důkladném vyklepání) lze likvidovat v komunálním odpadu.

Doba použitelnosti:

minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Číslo výrobní šarže/ Datum výroby:

uvedeno na obalu

Dodavatel:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424
100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959
274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz • www.pelgar.cz



s.r.o.

Výrobce:

PelGar International Ltd.
Newman Lane
Alton, Hampshire, GU34 2QR
Velká Británie
www.pelgar.co.uk



International

Bezpečnostní list k přípravku najdete na www.pelgar.cz

UFI: ASS2-X0A3-700K-WWC8

NORAT je registrovanou ochrannou známkou PelGar International Ltd., Velká Británie.

POVOLENÍ MZDR: CZ-0018939-0000